


TUBERCULOSE

(LAME 4)

« Ganglion lymphatique avec inflammation granulomateuse (épithélioïde et géantocellulaire) avec nécrose caséuse »

Ganglion normal


Organe plein, arrondi,
Limité par une capsule, en-dessous de laquelle on retrouve le sinus sous-capsulaire.
Cortex ganglionnaire composé de follicules lymphoïdes, dont certains sont à centres clairs.
Zone paracorticale.
Médullaire ganglionnaire.
Sur une lame, rechercher capsule, sinus sous-capsulaire et follicules lymphoïdes.




2°) Granulome tuberculoïde

- Formé de **cellules épithélioïdes éosinophiles** avec noyau ovoïde ou en « semelle de chaussure » + **cellules géantes multinucléées** avec noyaux en couronne (cellules de type Langhans)
- Peut être centré par de la **nécrose caséuse**.
- Cerné en périphérie par de la **fibrose collagénique** et des **lymphocytes** (± plasmocytes).

Débris cellulaires. On ne peut ni reconnaître de tissu ni de cellules particulières.




Plages de nécrose caséuse (cernées par ϕ épithélioïdes)



Espaces vasculaires du sinus sous-capsulaire

Capsule

Follicule lymphoïde (à centre clair)



1°) Est-ce que c'est un ganglion ? Aller checker en périphérie

À faible grossissement, on perçoit déjà des plages de nécrose caséuse, éosinophiles, « en carte de géographie ».