**ADÉNOME COLIQUE** (LAME 10) « Adénome tubuleux et tubulo-villeux avec dysplasie de bas grade»

Pièce opératoire (contient couches profondes)
Coloration Hématéine-éosine
H : colore les noyaux en bleu.
E : colore le cytoplasme en rose.

*On reconnait tout de suite la **zone pathologique** qui apparait **davantage bleutée** (se traduit pas un surnombre des cellules épithéliales, dont le noyau est coloré à l'hématéine)*
*Architecture **tubuleuse***




**Paroi colique altérée**
- Aspect pseudostratifié de l'épithélium.
- Diminution de la mucosécrétion en général (ici conservée).
- Augmentation de la taille des noyaux (d'où coloration bleue)
- Quelques mitoses.
- Chorion inflammatoire.
- Pas d'infiltration tumorale du chorion (définirait le caractère malin de la lésion ; donc ici lésion pré-cancéreuse, bénigne).

**Aspect de paroi colique « normale » avec ses 5 couches :**
- Muqueuse (épithélium glandulaire + chorion)
- Musculaire muqueuse.
- Sous-muqueuse.
- Musculeuse (¢s très éosinophiles).
- Sous-séreuse.



**Épaississement de la musculaire muqueuse** (éosinophile)
+ **infiltrat lymphocytaire**.

*Architecture **villeuse***




Glande de Lieberkühn



Épithélium intestinal

¢ caliciforme mucosécrétante

¢ absorbante (entérocyte)

**Diagnostic d'organe**
Muqueuse avec aspect en « **champ de marguerites** » des **glandes de Lieberkühn**



**± Nodules lymphoïdes de la sous-muqueuse** (lymphocytes + plasmocytes)

**ADÉNOCARCINOME COLIQUE** (LAME 11)

« Adénocarcinome colique (lieberkühnien) bien différencié infiltrant la musculeuse »

Pièce opératoire (contient couches profondes)
Coloration Hématéine-éosine
On appelle le **tissu conjonctif** d'une tumeur maligne le « **stroma** ».




**Prolifération épithéliale formant des tubes irréguliers**

Aspect en faveur du caractère **malin** de la tumeur :

- **Envahissement de la musculeuse par les cellules tumorales.**
  - Pour cancer du côlon, on parle d'un T2 (TNM) quand cellules tumorales atteignent musculeuse.
- **Ulcération de la muqueuse et sous-muqueuse** détruites par la tumeur.





**Anomalies cytologiques des cellules tumorales :**

- Anisocytose.
- Anisocaryose.
- Noyaux hyperchromatiques.
- Augmentation du rapport nucléocytoplasmique.