Embolie Pulmonaire (thrombi proximaux bilatéraux)

Grille de correction officielle

Grille de correction de l'étudiant :

Total des points		100
Anamnèse, interrogatoire	2	12
Antécédents médico-chirurgicaux: aucun		1
Antécédents cardio-vasculaire: aucun		1
Facteurs de risque cardiovasculaire: tabagisme actif à 10 PA		1
Traitement habituel: aucun		1
Dyspnée à quantifier selon NYHA: II NYHA		2
Mode de survenue : brutale, ayant débuté il y a deux heures		1
Signes fonctionnels associés (DT, douleur aux mollets, toux, palpitations): aucun		3
Retour d'un facteur déclenchant: voyage long courrier il y a 48 heures		2
sous total	0	
Examen physique		16
PA 130/ 85 mm Hg		1
FC : 100/min		2
SaO2 : 90% en AA	\vdash	1
T°C à 37,2°C	\vdash	1
Dextro capillaire: 6 mmol/l	\vdash	1
Fréquence respiratoire à 30/min (polypnée)	\vdash	2
Recherche de signes de choc: aucun	\vdash	2
Recherche de signes d'insuffisance cardiaque droite	\vdash	2
Recherche de signes de TVP, examen vasculaire: normal, pas de signes de TVP	\vdash	2
Auscultation cardiaque: bdc réguliers, tachycardes, sans souffle	\vdash	1
Auscultation pulmonaire: baisse du MV aux bases	\vdash	1
sous total		
Examens complémentaires		37
Andrew Control of the		4
GDS + lactates (1): effet shunt (3)	\vdash	1
Troponine: négative	\vdash	1
BNP: normal (50 pg/ml)	\vdash	1
Ionogramme sanguin, urée, créatinine	\vdash	1
Bilan hépatique: normal	\vdash	1
Bilan d'hémostase: TP, TCA,	\vdash	1
NFS-plaquettes	(4)	
ECG 12 dérivations: tachycardie sinusale (2), QRS fins (1), S1Q3 (2), ondes T négativesV1-3	(1)	6 5
Radiographie thoracique: ascension de la coupole droite (3), atélectasie en base droite (2)	\vdash	4
ETT (2) à la recherche de signes de CPA (4) : normale	\vdash	
EDVMI: pas de TVP	\vdash	5 7
Angioscanner thoracique (3) thrombi proximaux bilatéraux (4) sous total		/
	U	40
Diagnostic		15
Embolie pulmonaire bilatérale à bas risque ou sans signe de gravité	\vdash	
a das risque ou sans signe de gravite sous total		5
Traitement	U	30
		5
Hospitalisation en cardiologie	\vdash	
Oxygénothérapie nasale	\vdash	3
Mise en conditions: pose d'une voie veineuse périphérique	\vdash	2 5
Repos strict au lit	\vdash	
Anticoagulation efficace par HBPM avec relais rapide par AVK ou NACO		5
Pendant une durée de 6 mois		5
Arrêt du tabac	ليا	5
sous total	0	

TOTAL